

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Мультитоник»

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регистрационный номер: РФ-КД-00203.

Торговое наименование кормовой добавки: «Мультитоник» (Multitonic).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 л содержатся действующие вещества: витамин А – 4,72-7,08 г, витамин D3 – 0,32-0,48 г, витамин Е – 8,0-12,0 г, витамин В1 – 8,0-12,0 г, витамин В2 – 3,2-4,8 г, витамин В3 – 24,0-36,0 г, провитамины В5 – 16,0-24,0 г, витамин В6 – 2,4-3,6 г, DL-метионин – 4,0-6,0 г, L-лизин – 2,0-3,0 г; вспомогательные вещества: полисорбат-80 – 80,0-120,0 г, аскорбиновая кислота – 6,0-10,0 г, трилон Б – 0,6-1,0 г, нипагин М – 0,24-0,30 г, нипазол – 1,44-1,80 г, хлористоводородная кислота 10 % – 6,96-8,70 г, вода очищенная – до 1 л.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание витамина А – 8 000 000-12 000 000 МЕ/л, витамина D3 – 1 600 000-2 400 000 МЕ/л, витамина Е – 8,0-12,0 г/л, витамина В1 – 8,0-12,0 г/л, витамина В2 – 3,2-4,8 г/л, витамина В3 – 24,0-36,0 г/л, провитамина В5 – 16,0-24,0 г/л, витамина В6 – 2,4-3,6 г/л, DL-метионина – 4,0-6,0 г/л, L-лизина – 2,0-3,0 г/л.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл во флаконы стеклянные, укупоренные резиновыми пробками с колпачками алюминиевыми или комбинированными с пластмассовыми крышками, жестко закрепленными в дне алюминиевыми колпачками, или пластиковые флаконы из полиэтилена высокого давления, укупоренные крышками из полимерного материала с винтовой резьбой с герметизирующими прокладками и контролем первого вскрытия.

По 500 мл, 1000 мл в пластиковые флаконы из полиэтилена высокого давления, укупоренные крышками из полимерного материала с винтовой резьбой с герметизирующими прокладками и контролем первого вскрытия.

По 5000 мл в канистры полимерные из полиэтилена высокого давления, укупоренные крышками из полимерного материала с винтовой резьбой с герметизирующими прокладками и контролем первого вскрытия.

К флаконам могут быть приложены дозаторы-капельницы.

Допускается упаковка в индивидуальную картонную пачку.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Опалесцирующая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого с красноватым оттенком цвета со специфическим запахом. Допускается выпадение осадка при хранении.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

2 года с даты производства, после вскрытия упаковки – 28 дней.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. ИНФОРМАЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены компонентами, входящими в состав, которые обладают высокой биодоступностью. Сбалансированное количество витаминов и аминокислот, в том числе незаменимых, компенсирует дефицит биологически активных веществ в организме животных, нормализует обмен веществ, способствует повышению неспецифической резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды.

Применение кормовой добавки при несбалансированном кормлении, стрессах, в периоды интенсивного роста, высокой продуктивности ведет к повышению сохранности поголовья, особенно молодняка, увеличению продуктивности.

Витамин А – необходим для нормального роста и воспроизводства, а также повышения устойчивости организма к возбудителям различных заболеваний.

Витамин D3 – совместно с гормоном паращитовидной железы принимает участие в регуляции фосфорно-кальциевого обмена в организме животных, а также минерализации костной ткани.

Витамин Е – регулирует в организме животных воспроизводительную функцию.

Витамин В1 – играет ключевую роль в метаболизме углеводов, принимает участие в синтезе ТПФ (тиамин пирозинфосфат) и АТФ (аденозин трифосфат).

Витамин В2 – предупреждает у животных воспаления слизистых оболочек глаз, желудочно-кишечного тракта, ротовой полости и т.д.; отвечает за интенсивность тканевого дыхания; участвует в углеводном и жировом

обмене; необходим для синтеза гемоглобина.

Витамин В3 – способствует превращению углеводов и жиров в энергию; необходим для работы нервной системы, пищеварительного тракта и для выработки половых гормонов.

Провитамин В5 – принимает активное участие в процессе формирования антител, участвует в метаболизме жирных кислот, активизирует окислительно-восстановительные процессы, нормализует липидный обмен и помогает организму усвоить другие витамины.

Витамин В6 – стимулятор в обмене веществ, является коферментом белков, которые участвуют в переработке аминокислот и регулируют усвоение белка. Принимает участие в производстве кровяных телец и их красящего пигмента – гемоглобина и участвует в равномерном снабжении клеток глюкозой.

DL-метионин – является незаменимой аминокислотой, содержащей атом серы в составе; является прекурсором цистина и таурина (образуется из цистина), в ряде биохимических реакций метаболизируется до большого спектра различных веществ. Играет важную роль в синтезе таких белков как карнитин или мелатонин.

L-лизин – незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков, необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

Назначение: для обогащения и балансирования рационов питания сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной птицы, мелких домашних животных, пушных зверей витаминами и аминокислотами.

Показания для применения: восполнение дефицита витаминов и аминокислот в организме животных, в том числе при стрессах, вызванных вакцинацией, высокими температурами или резкими перепадами температур, а также для улучшения конверсии корма.

Противопоказания для применения: не установлено.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- телятам, козам и овцам – 1 мл на 20 кг веса животного;
- стельным и лактирующим коровам – 1 мл на 40 кг веса животного;
- курам-несушкам, цыплятам-бройлерам, индейкам – 1 л на 2000 л воды для поения;
- пороссятам-отъемышам, свиноматкам – 1 л на 2000 л воды для поения;
- кошкам, собакам, пушным хищным зверям (хорьки, феньки) – 0,5 мл (или 2 капли) на 5 кг веса животного;
- щенкам с профилактической целью – 0,1 мл/кг 1 раз в неделю, курсом 2 недели.

Способы применения:

Применяют индивидуально или групповым способом, смешивая с водой для поения.

При групповом способе в период применения животные должны получать только воду, содержащую кормовую добавку. Водный раствор кормовой добавки следует готовить ежедневно, исходя из суточной потребности животных, в том числе птицы, в воде. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно взболтать.

Продолжительность применения:

Телятам, стельным и лактирующим коровам, козам, овцам, курам-несушкам, цыплятам-бройлерам, индейкам, пороссятам-отъемышам, свиноматкам – в течение 5 дней.

Кошкам, собакам, пушным хищным зверям (хорьки, феньки) – 2 раза в неделю или ежедневно на протяжении 10 дней.

Щенкам с профилактической целью – 0,1 мл/кг 1 раз в неделю, курсом 2 недели.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, г. Серпухов, п. Оболенск, ул. Строителей, стр. 2.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, г. Серпухов, п. Оболенск, ул. Строителей, стр. 2.

Наименование и адрес производственной площадки производителя:

ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, г. Серпухов, п. Оболенск, ул. Строителей, стр. 2.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Мультитоник» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.