

ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектицидного средства Киллер Флай для уничтожения мух, тараканов, блох и других членистоногих в животноводческих помещениях и других объектах ветеринарного надзора

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Киллер Флай (Killer Fly) – инсектицидное средство для уничтожения мух, тараканов, блох и других членистоногих в животноводческих помещениях и других объектах ветеринарного надзора.

2. Киллер Флай содержит в 1 кг в качестве действующего вещества – тиаметоксам 100 г (10%), а в качестве вспомогательных веществ - Z-9-трикозен (мускамон), тартразин, среднецепочечные триглицериды, лактозу моногидрат, сахарозу пищевая.

3. По внешнему виду средство представляет собой гранулированный порошок от светло-жёлтого до бежевого цвета.

Срок годности инсектицидного средства при соблюдении условий хранения – 5 лет с даты производства.

Запрещается применение средства по истечении срока годности.

4. Выпускают инсектицидное средство расфасованным по 30, 50, 100, 400 и 500 г в полимерных банках с навинчиваемыми крышками.

5. Хранят средство в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от -10 °С до + 30 °С.

6. Средство следует хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных.

7. Неиспользованное средство и его рабочий раствор уничтожают отдельно от бытовых отходов в специально отведенных местах, вдали от источников питьевой воды и водоемов.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. Киллер Флай относится к инсектицидным средствам.

Тиаметоксам, входящий в состав препарата, является соединением из группы никотиноидов, обладает контактным и кишечным инсектицидным действием, активен в отношении обитающих в животноводческих помещениях мух, блох, тараканов и других членистоногих, в том числе резистентных к фосфорорганическим инсектицидам, пиретроидам и карбаматам. Тиаметоксам является антагонистом никотин-ацетилхолиновых рецепторов, вызывает гиперполяризацию мембраны нервного волокна насекомых и приводит к пролонгированному открытию натриевых каналов. Половой феромон мух - Z-9 трикозен обеспечивает привлечение, а наличие в составе сахара способствует охотному поеданию препарата мухами. Остаточное инсектицидное действие средства на поверхностях в зависимости от способа обработки и типа поверхности продолжается 4-8 недель.

9. По степени воздействия на организм средство относится к малоопасным веществам (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых концентрациях не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием. Токсично для рыб и пчел.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

10. Киллер Флай применяют для дезинсекции животноводческих помещений и других объектов ветеринарного надзора.

11. Средством обрабатывают места скопления насекомых, как внутри помещения, так и снаружи. Не подлежат обработке места размножения насекомых, так как средство действует только на взрослых особей.

12. Киллер Флай применяют путем раскладывания приманок, нанесения раствора на поверхность или распыления раствора на поверхность.

Нанесение мазков на поверхность

Для приготовления рабочего раствора в отдельной емкости растворяют 100 г гранул средства в 80 мл воды и тщательно размешивают до получения однородной суспензии. Приготовленного рабочего раствора достаточно для обработки помещений с площадью пола 40 м². Раствор наносят кистью на поверхность полосками размером 10х30 см. Следует наносить не менее 8 полосок для обработки помещений с площадью пола 40 м². При использовании инсектицидного средства, Киллер Флай, расфасованного в банки по 400 г, препарат смешивают с водой из расчета 400 г на 320 мл воды и тщательно размешивают. Приготовленного рабочего раствора достаточно для обработки помещений с площадью пола 160 м². Раствор наносят кистью на поверхность

полосками размером 10х30 см. Следует наносить не менее 30 полосок для обработки помещений с площадью пола 160 м². При отсутствии удобных поверхностей для нанесения раствора, при наличии деревянных, оштукатуренных и побеленных поверхностей или вследствие нежелательности нанесения средства непосредственно на стены и предметы интерьера, раствор наносят на полоски картона или полиэтиленовой ленты и прикрепляют их к стенам или подвешивают к потолку. Срок инсектицидного действия средства при нанесении мазков на поверхность составляет 6–8 недель.

Распыление на поверхность

Для приготовления рабочего раствора в емкости аппарата для опрыскивания растворяют 100 г гранул средства в 800 мл воды и тщательно размешивают до получения однородной суспензии. Приготовленного рабочего раствора достаточно для обработки помещений с площадью пола 20 м². При использовании инсектицидного средства Киллер Флай, расфасованного в банки по 400 г, препарат смешивают с водой из расчета 400 г на 3,2 л воды и тщательно размешивают до получения однородной суспензии. Приготовленного рабочего раствора достаточно для обработки помещений с площадью пола 80 м². Непосредственному опрыскиванию следует подвергнуть около 30 % поверхности стен и потолка. В свинарниках следует опрыскивать поверхность стен на высоте более 1,5 м от поверхности пола, а на фермах для крупного рогатого скота — на высоте более 2 м от пола. Помещение можно использовать снова после высыхания опрысканных поверхностей. Срок инсектицидного действия при распылении препарата на поверхность составляет 4–6 недель. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям: при скоплении мух или постоянном залете их в помещение.

13. Запрещается обрабатывать поверхности, с которыми будут соприкасаться продукты питания или корм для животных, кормушки и поилки, а также поверхности, с которыми могут контактировать животные. Препарат не следует наносить на грязные, сильно пористые, либо свежепобеленные поверхности.

14. При правильном использовании и дозировке побочные явления не наблюдаются.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. К работе с Киллер Флай не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с химическими веществами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания средства внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с инсектицидным средством и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.). Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть руки и лицо водой с мылом, рот прополоскать.

При попадании средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды с мылом. При попадании внутрь – выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать.

При попадании в глаза - следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку средства.

Запрещается использовать тару из-под средства для пищевых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

16. Организация - производитель:

ООО «НПК «Асконт+». РФ, 142279, Московская область, г. Серпухов, п. Оболенск, ул. Строителей, строение 2.