

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Элеовит NEO
(Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+». РФ, 142279, Московская обл.,
г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал Б. д.25)
Номер регистрационного удостоверения: 32-3-4.26-5463№ПВР-3-4.26/04176

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: (Eleovit Neo).

Международное непатентованное наименование: ретинол, холекальциферол, альфа-токоферила ацетат, тиамин, рибофлавин, никотинамид, декспантенол, пиридоксин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Элеовит Neo в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: витамин А пальмитат – 10 000 ME, витамин Д3 – 2 000 ME, витамин Е ацетат – 10,0 мг, витамин В1 гидрохлорид – 10,0 мг, витамин В2 – 4,0 мг, витамин В3 – 30,0 мг, провитамин В5 – 20,0 мг, витамин В6 гидрохлорид – 3,0 мг и вспомогательные вещества: полисорбат-80, пропиленгликоль, лимонная кислота моногидрат, аскорбиновая кислота, трилон Б, нипагин М – 0,5 мг, нипазол М – 0,3 мг, бутилгидрокситолуол, бутилгидроксанизол, натрия гидроксид и вода для инъекции.

По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую жидкость (допускается опалесценция) от оранжевого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения допускается образование небольшого количества осадка, исчезающего при встряхивании.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – не более 28 суток.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками с колпачками алюминиевыми или комбинированными с пластмассовыми крышками, жестко закрепленными в дне алюминиевых колпачков. Допускается вторичная потребительская упаковка по 50 штук в картонную коробку.

Каждую потребительскую упаковку препарата снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: витамины в комбинациях.

10. Входящие в состав препарата витамины оказывают комплексное действие на организм животных.

Витамин А, необходим для регуляции процессов роста, обмена веществ в организме, участвует в процессах регенерации кожного покрова и слизистых оболочек, в формировании иммунитета, оказывает положительное влияние на репродуктивные функции животных, участвует в образовании зрительного пурпура палочек сетчатки глаза.

Витамин Д3 влияет на общий обмен веществ при метаболизме кальция и фосфора. Прежде всего, он стимулирует всасывание из кишечника кальция, фосфатов и магния. Важным эффектом витамина при этом процессе является повышение проницаемости эпителия кишечника для кальция и фосфора. Как витамин он поддерживает уровень органического Р и Са в плазме крови и выше порогового значения и повышает уровень всасывания Са в тонком отделе кишечника.

Витамин Е, являясь мощным антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в биосинтезе гемоглобина и белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании и других процессах метаболизма в клетках, усиливает действие витаминов А и Д.

Витамины группы В обладают высокой биологической активностью, играют важную роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных процессов.

По степени воздействия на организм препарат относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Препарат применяют сельскохозяйственным животным для профилактики и лечения гиповитаминозов, а также заболеваний, развивающихся на их фоне; при задержке роста и развития молодняка; при стрессах (транспортировка животных, в период вакцинации, дегельминтизации, смена рациона), в комплексной терапии дерматитов, длительно не заживающих ран и язв, воспалительных процессов на слизистых оболочках; в период реконвалесценции, в периоды повышенной физиологической потребности организма в витаминах на фоне увеличения продуктивности, беременности

и лактации, для повышения воспроизводительной функции.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. К работе с препаратом не допускаются лица с признаками аллергических, респираторных, желудочно-кишечных заболеваний или кожных поражений. Пустые флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Особенности применения беременным животным, животным в период лактации, потомству животных не выявлено.

15. Препарат вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте укола в сторону во избежание вытекания раствора. В зимнее время перед применением лекарственное средство следует подогреть на водяной бане до комнатной температуры.

С профилактической целью препарат вводят двукратно с интервалом 2 недели.

С лечебной целью лекарственный препарат вводят двукратно с интервалом 7 дней. При необходимости курс применения повторяют.

Вид животного	Возрастная и технологическая группа	Количество в сутки, мл на голову
Крупный рогатый скот	взрослое поголовье	6
	молодняк (с 6-ти до 12-месячного возраста)	3
Лошади	взрослое поголовье	5
	молодняк (с 6-ти до 12-месячного возраста)	3
Овцы, козы	взрослое поголовье	2
	ягнята, козлята	1

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В месте инъекции препарата может наблюдаться образование незначительной припухлости и легкое покраснение кожи, самопроизвольно исчезающих в течение нескольких дней. В редких случаях возможны аллергические реакции, при возникновении которых, применение препарата прекращают и назначают антигистаминную и симптоматическую терапию.

17. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, у животных не установлено.

18. Препарат совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.

19. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема одной или нескольких доз препарата его применение возобновляют по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией.

21. Продукцию от животных после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «НПК «Асконт+». РФ, 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал Б, д.25.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «НПК «Асконт+». РФ, 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал Б, д.25.

ВКП001