

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

И подготовки коров к осеменению в послеотельный период



Выполняемые работы	Сроки выполнения	Примечания
Профилактика возникновения эндометритов	1-й день после отела	Энрамакс п/к однократно в дозе 5 мл/100 кг массы животного (при необходимости можно повторить введение через 48 часов), максимальный объем препарата для введения в одно и то же место не должен превышать 20 мл. Внутриматочное введение пенообразующих препаратов
Сокращение сроков инволюции матки	1-й день после отела	Эстрофантин 3 мл

Продолжение таблицы см. на следующей странице

Витаминация, повышение общеге общей резистентности	1-й день после отела	Элеовит (или его аналоги) в дозе 5-6 мл в/м, однократно
Стимуляция энергетического обмена	2-й день после отела	Бутахим 20 - 25 мл в/м
Сокращение сроков инволюции матки	3-й день после отела	Метриприм доза - 10 мл в/м Бутахим 20 - 25 мл в/м
Стимуляция энергетического обмена	4-й день после отела	Бутахим 20 - 25 мл в/м
Сокращение сроков инволюции матки	5-й день после отела	Метриприм доза - 10 мл в/м
Сокращение сроков инволюции матки	7-й день после отела	Метриприм доза - 10 мл в/м
Сокращение сроков инволюции матки	9-й день после отела	Метриприм доза - 10 мл в/м
Ректальное обследование с целью выявления патологии матки на ранних стадиях	9-10-й день после отела	При выявлении метрита и других патологий - лечение согласно поставленному диагнозу

