



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

И подготовки коров к осеменению в послеотельный период



Выполняемые работы	Сроки выполнения	Примечания
Профилактика возникновения эндометритов	1-й день после отела	Энрамакс п/к однократно в дозе 5 мл/100 кг массы животного (при необходимости можно повторить введение через 48 часов), максимальный объем препарата для введения в одно и то же место не должен превышать 20 мл. Внутриматочное введение пенообразующих препаратов
Сокращение сроков инволюции матки	1-й день после отела	Эстрофантин 3 мл

Продолжение таблицы см. на следующей странице

Витаминизация,
повышение общении общей
резистентности

1-й день после отела

Элеовит (или его аналоги) в дозе 5-6 мл в/м,
однократно

Стимуляция энергетического
обмена

2-й день после отела

Бутахим 20 - 25 мл в/м

Сокращение сроков
инволюции матки

3-й день после отела

Метриприм доза - 10 мл в/м
Бутахим 20 - 25 мл в/м

Стимуляция энергетического
обмена

4-й день после отела

Бутахим 20 - 25 мл в/м

Сокращение сроков
инволюции матки

5-й день после отела

Метриприм доза - 10 мл в/м

Сокращение сроков
инволюции матки

7-й день после отела

Метриприм доза - 10 мл в/м

Сокращение сроков
инволюции матки

9-й день после отела

Метриприм доза - 10 мл в/м

Ректальное обследование
с целью выявления патологии
матки на ранних стадиях

9-10-й день после отела

При выявлении метрита и других патологий -
лечение согласно поставленному диагнозу



У препаратов имеются противопоказания.
Необходимо ознакомиться с инструкцией