

НОВИНКА УЖЕ В ПРОДАЖЕ ♦ НОВИНКА УЖЕ В ПРОДАЖЕ ♦ НОВИНКА УЖЕ В ПРОДАЖЕ

МЕТРИПРИМ

НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И РОДОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



100 мл

**СТИМУЛИРУЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ
ТОНУС МАТКИ ДО 12 ЧАСОВ**



- ♦ УСИЛЕНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ МАТКИ
- ♦ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ
- ♦ СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ
- ♦ СТИМУЛЯЦИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ♦ ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МЯСУ И МОЛОКУ



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения

ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

 **АСКОНТ+**

МЕТРИПРИМ

НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И РОДОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

СОСТАВ. В 1 мл препарата содержится: пропранолола гидрохлорид – 5 мг, вспомогательные вещества.

Метриприм не является гормональным препаратом, относится к неселективным β-адреноблокаторам, которые активизируют сократительную функцию гладкой мускулатуры матки, что усиливает действие эндогенного окситоцина, оказывает мембраностабилизирующее действие, является антагонистом катехоламинов, обладает выраженным антистрессовым действием. Обладает антиангинальным и антигипоксическим свойствами, нормализует работу сердечно-сосудистой системы, уменьшает кровотечения при родах.

ПОКАЗАНИЯ: Коровам и свиноматкам применяют для стимуляции родов при атонии, гипотонии матки, для профилактики задержания последа. При субинволюции матки, в составе комплексной терапии для лечения послеродового эндометрита у коров и синдрома «метрит-мастит-агалактия» у свиноматок, для повышения оплодотворяемости, извлечения эмбрионов у коров-доноров.



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ: Внутримышечно или внутривенно. Дозировки – см. таблицу:

Показания к применению / Кратность применения	Доза на одно животное, мл	
	Корова	Свиноматка
Для стимуляции родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений – однократно в день родов	10	5
При задержании последа – трехкратно с интервалом 12 часов	10	–
Для лечения субинволюции матки и послеродовых эндометритов – трехкратно с интервалом 24 часа	10	5
Для профилактики синдрома «метрит-мастит-агалактия» у свиноматок – однократно сразу после родов	–	5
При искусственном осеменении для повышения оплодотворяемости – однократно за 20-30 минут до процедуры	5	5
При извлечении эмбрионов у коров-доноров – за 10-15 минут до вымывания	5	–

СРОКИ ОЖИДАНИЯ: Без ограничений по продукции животноводства.