

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

МЕЛОКСИПРИМ

СЕЛЕКТИВНЫЙ БЛОКАТОР ЦОГ-2 ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

100 мл

Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения



САМЫЙ
БЕЗОПАСНЫЙ
НПВС



СОСТАВ (в 1 мл): 20,0 мг МЕЛОКСИКАМА,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА



- ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЦОГ-2 В ОБЛАСТИ ВОСПАЛЕНИЯ;
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ — УМЕНЬШАЕТ ВЫРАБОТКУ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ;
- ВЫРАЖЕННЫЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ;
- ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ — ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНТР ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

СРОК ГОДНОСТИ —
36 МЕСЯЦЕВ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

МЕЛОКСИПРИМ

БЕЗОПАСНЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ НПВС ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

СОСТАВ

СОСТАВ (в 1 мл): 20,0 мг МЕЛОКСИКАМА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ





Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов в результате избирательного подавления ферментативной активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), участвующей в биосинтезе простагландинов в области воспаления.

ПОКАЗАНИЯ

Назначают сельскохозяйственным и мелким домашним животным

- в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и жаропонижающего препарата для лечения острых воспалительных процессов и снятия болевых синдромов различной этиологии;
- в качестве патогенетического лечения при синдроме воспаления (мягких тканей, опорно-двигательного аппарата и прочего);
- в качестве симптоматического лечения болевого синдрома различной этиологии, в том числе в послеоперационный период, при травматических повреждениях;
- при лихорадочных состояниях;
- в терапии с этиотропными препаратами.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

-  **КРС** – однократно подкожно или внутривенно в дозе 1 мл на 40 кг массы животного, с возможной повторной инъекцией через 24 часа.
-  **Свиньям** – однократно внутримышечно в дозе 1 мл на 50 кг массы животного, с возможной повторной инъекцией через 24 часа.
-  **Лошадям** – однократно внутривенно в дозе 1 мл на 33 кг массы животного. Продолжительность курса лечения зависит от состояния животного.
-  **МДЖ (собакам, кошкам)** – однократно внутримышечно в дозе 0,1 мл на 50 кг массы животного, с возможной повторной инъекцией через 24 часа.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ

Убой КРС на мясо – через 15 суток; свиней, лошадей – через 5 суток после последнего применения препарата.

Молоко разрешается использовать для пищевых целей через 5 суток после последнего применения препарата.



100 мл

Внешний вид упаковки препаратов может отличаться от изображения