

# ЦЕФТИПРОФ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

**АНТИБИОТИК + НПВС**

В 1 мл содержится:  
цефтиофур – 100 мг, кетопрофен – 150 мг



**ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА –  
ЧЕРЕЗ 48 Ч ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ИНЪЕКЦИИ!**

**48**  
часов



- СОЧЕТАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО, ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО И ЖАРОПОНИЖАЮЩЕГО ЭФФЕКТА В ОДНОЙ ИНЪЕКЦИИ
- ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ДВ – НИЗКАЯ ДОЗА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ
- МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ 30 МИН С МОМЕНТА ВВЕДЕНИЯ
- ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ В МОЛОКЕ ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕСТАМИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения





# ЦЕФТИПРОФ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

**АНТИБИОТИК + НПВС**

В 1 мл содержится:  
цефтиофур – 100 мг, кетопрофен – 150 мг



## ПОКАЗАНИЯ

Цефтиофур является полусинтетическим антибиотиком цефалоспоринового ряда III поколения, обладает широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу и некоторые анаэробные бактерии: *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Arcanobacterium pyogenes*.

Препарат применяют при респираторных заболеваниях, межпальцевом некробактериозе, остром послеродовом эндометрите, мастите и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят подкожно или в/м животным один раз в сутки в следующих дозах:

Вид животного	Дозировка мл/кг веса	Продолжительность лечения (дней)
 КРС, МРС	1 мл на 100 кг	3 дня
 Свиньи	1 мл на 32 кг	3 дня

**ЦЕФТИПРОФ – ЭТО ВЫГОДНАЯ СТОИМОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ.  
РАСХОД ПРЕПАРАТА В 2 РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ У АНАЛОГОВ.**

**ЦЕФТИПРОФ – ЭТО СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ  
НА ОБРАБОТКУ СТАДА:**

**ЦЕФТИПРОФ**

3 дня однократно  
= 3 инъекции



**АНАЛОГ**

3 дня однократно  
Антибиотик + НПВС  
= 6 инъекций



## СРОКИ ОЖИДАНИЯ



Убой КРС и МРС на мясо разрешается не ранее, чем через 4 суток, свиней – не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата.



Молоко можно использовать в пищу через 48 часов.

Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения

